Российские вакцины против коронавируса

Заразиться COVID–19 непосредственно от вакцин невозможно

Разработчик | Тип вакцины | Принцип действия | Вводится | Устойчивый иммунитет

Спутник V

НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи

Формируется через 21 день после второй вакцинации

Двукратно, с интервалом в 3 недели

Профилактическая*

На основе аденовируса и гена белка SARS-CoV-2. Вирус доставляет в клетку генетический материал, но не может размножаться и вызвать заболевание. После введения организм начинает вырабатывать антитела

Спутник Лайт**

НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи

Формируется через 28 дней после вакцинации

Однократно

Профилактическая*

На основе аденовируса и гена белка SARS-CoV-2. Вирус доставляет в клетку генетический материал, но не может размножаться и вызвать заболевание. После введения организм начинает вырабатывать антитела

ЭпиВакКорона

ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор»

Формируется через 21 день после второй вакцинации

Двукратно, с интервалом в 14–21 день

Профилактическая*

На основе пептидов — фрагментов белка S SARS-CoV-2. Пептиды закреплены на белке-носителе, который вместе с гидроксидом алюминия помогает усилить иммунный ответ. После введения в организм стимулирует выработку антител

КовиВак

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН

Формируется на 14 день после второй вакцинации

Двукратно, с интервалом в 2 недели

Профилактическая*

На основе инактивированного вируса. Вместе с ним и вспомогательным веществом, гидрооксидом алюминия, в организме запускается имунный ответ

Повторная вакцинация рекомендуется через 6 месяцев после первой вакцинации или после болезни

Возможные побочные явления

- Кратковременное повышение температуры
- Головная боль
- Слабость
- Боль в мышцах и суставах
- Заложенность носа
- Першение в горле
- Сыпь
- Аллергические реакции

* Не лечит, а защищает от заболевания

** Используется после болезни или при ревакцинации

© АНО «Национальные приоритеты», 2021. Источник: стопкоронавирус.рф.