

Ситуация
Весенние сильные ветры у многих потрепали кустарники и деревья, а теперь садоводы остались без урожая.



Что за напасть: один год заморозки убивают зачатки плодов, другой год – тепло, так ураганные ветра если не ломают деревья и кустар-

Цвело обильно, а плодов нет

ники, то лишают их зачатков яблок, груш, вишни, абрикосов. Неужели на непогоду нет совсем никакой управы? Разберёмся с проблемой этого года.

Для вишни, смородины, абрикосов и яблонь реально помочь может физическая защита – ветрозащитные экраны. Хлопотно, но действенно. Вкопайте по периметру сада с наветренной стороны (обычно западной и юго-западной) высокие колья и натяните мелкую садовую сетку или белый спанбонд. Высота – не менее двух или двух с половиной метров (выше крон молодых деревьев).

Рабочий метод и снегозадержание зимой. Высокие сугробы вдоль забора весной тают медленно, создавая влажный и прохладный микроклимат, который задерживает

цветение на пять–семь дней. Если деревья зацветут позже возвратных заморозков и пика мартовских ветров – цветы сохранятся.

На будущее можно организовать живую изгородь: быстрорастущие кустарники – сирень, акация, лещина – по краю участка через два–три года станут отличным щитом.

Можно укрепить цветы изнутри. За три–пять дней до цветения и в его начале опрыскайте крону раствором борной кислоты (два грамма на десять литров воды). Бор укрепляет цветоножки, и цветы прочнее держатся на ветках, даже при сильных порывах. Или опрыскать «Эпином» или «Цирконом» за сутки до прогнозируемого ветра: эти препараты повышают упругость тканей, снижают стресс, цветы становятся менее хрупкими.

Внекорневая подкормка калием за неделю до цветения утолщит клеточные стенки цветоножек и завязей.

Стратегический приём – сдвиг цветения. Побелка стволов ранней весной помогает отражать солнечные лучи, кора прогревается медленнее, дерево просыпается на три–пять дней позже. Ветры в апреле бывают сильнее, чем в мае, поэтому позднее цветение часто оказывается в более спокойный период.

Мульчирование приствольного круга толстым слоем снега задержит пробуждение корней и, соответственно, цветение.

А вот чего делать категорически не стоит, так укрывать деревья плёнкой – она парусит и ломает ветки. Не используйте агроткань

плотную к кроне – она сдирает цветы – только в виде экранов на расстоянии один–два метра от деревьев.

Самый рабочий вариант – высокие сетчатые щиты с наветренной стороны. Если поставить их один раз, они будут работать годами, защищая и цветы, и завязи, и даже плоды от града.



Овощная грядка

Кабачок – гниёт бочок?

Сам по себе этот овощ совершенно неприхотлив, но бывает, что уже молодой плод начинает гнить

Кабачок как культура пришёл к нам из Мексики, где его поначалу вообще разводили только для употребления семян в пищу. В Европе его также сначала выращивали как декоративную культуру. Употреблять в пищу кабачки стали только в XVIII веке в Италии. Можно догадаться, что по своему происхождению кабачок теплолюбив, но точнее – чувствителен к колебаниям температуры. Благоприятной температурой для выращивания является день плюс 24–26 градусов, а ночью не ниже плюс 15 градусов. При более низкой или высокой температуре кабачки могут не только сбрасывать завязи, но и начать гнить.

Если выращиваете кабачки в закрытом парнике или теплице, не забывайте постоянно проветривать, поскольку они не любят повышенную влажность (более 70 процентов).

В сырую и холодную погоду или когда ночью довольно прохладно, а на участке туман, у кабачков снижается иммунитет и новые молодые завязи могут просто начать гнить. В это время не лишним будет соорудить укрытия, поставить дуги и сверху на ночь использовать укрывной материал.

Полезно в такой ситуации дать кабачкам лекарство для укрепления иммунитета – «Эпин» и «Циркон». Чередуем препараты каждые пять дней (строго по инструкции), делаем внекорневые (по листьям) опрыскивания.

Полив холодной водой из шланга тоже может вызвать гниения кабачков не только ближе к осени, к концу вегетации, но и на начальной стадии её развития. Температура для полива, даже в жару, должна быть в пределах



плюс 24 градусов. Сам полив необходимо делать, когда подсыхает верхний слой почвы, примерно один раз в неделю из расчёта пять литров на куст, в жару можно увеличить не только число поливов, но и объём воды, особенно если жара стоит в период плодоношения. Поливаем каждые пять дней из расчёта десять литров воды на куст.

Второй причиной гниения плодов может быть густая посадка. Если кабачки посажены слишком близко друг к другу и их большие листья не дают завязям получить полноценное освещение, а главное, проветривание, плоды могут начать гнить и, что хуже, – это ещё и спровоцирует заболевание. Причинами гнили могут стать мучнистая роса, а также огуречный вирус. При мучнистой росе помогут «Фито-

спорин», «Алирин Б», а при огуречном вирусе бактерициды, например, «Фармайод». Для того чтобы было дополнительное освещение и проветривание, достаточно прорядить листья, удалить все старые.

Учитываем и то, что кабачки не любят кислые почвы. Место для выращивания должно быть солнечное, хорошо проветриваться, а грунтовые воды не должны залегать близко. В этом случае необходимо тогда сделать высокую грядку.

Нехватка микроэлементов, в частности бора или йода, могут привести к ослаблению иммунитета и, как следствие, кабачки становятся более подвержены различным заболеваниям, которые также вызывают гниение.

Сезонная работа

Сладка ягодка была

После сбора урожая нельзя бросать грядки с клубникой – их нужно обработать и подкормить.

Уход за клубникой в июле–августе – это основа урожая на следующий год. В это время наступает вторая волна наращивания листьев, а также отрастание новых рожков и закладка новых цветочных почек.

После сбора урожая необходимо обрезать все старые листья, чтобы не оставлять возбудителей болезней. Но, если вы также заметили, что отрастающие молодые листья сморщиваются, деформируются, это значит, что кусты заражены земляничным клещом. Сразу обработайте кусты клубники любым препаратом от клеща. Можно использовать акарициды («Клещевит») или инсектициды, например, «Актеллик», «Фитоверм».

Но не со всеми вредителями легко бороться. Например, на клубнике могут поселиться листовые или стеблевые нематоды. Листовые нематоды поражают листья. Между жилками появляются бледно-жёлтые пятна, которые со временем становятся коричневыми и отмирают.

При нашествии стеблевой нематоды черешки становятся короткими и недоразвитыми. Кустики отстают в росте и практически не выпускают усы. Кстати, в этом случае страдают и ягоды, они деформируются и становятся невкусными. Если на посадках есть уже такие вредители, то куст придётся выкапывать и сжигать.

Чтобы не допускать нематоды, необходимо проводить профилактическую обработку, например, препаратом «Флаграин-Д». Он есть как в жидком виде, так и в сухом. Раствор с осадком – это нормально, не должно смущать.

В этот период клубника набирает силы для следующего года (для плодоношения) и очень требовательна к запасу питательных веществ. Чтобы кустики не тратили лишние силы, удаляем все усы. Срез делаем на расстоянии 5–7 сантиметров от точки роста, вырывать опасно, хотя бы потому, что можно перестараться и выкорчевать всё растение. Если хотите размножить сорт, оставьте первую розетку рядом с материнским кустом.

После обрезки старых листьев и усов необходимо провести обработку не только от вредителей, но и от заболеваний. Можно использовать препараты «Скор» или «Хорус». После обработки от заболеваний и вредителей, дня через три, можно делать первую подкормку, используя удобрения с макроэлементами.

На этом этапе важен и азот, поскольку он помогает нарастить новую молодую листву, но перебарщивать с ним не стоит.

Первой подкормкой после плодоношения может стать настой коровяка 1:10 или куриного помёта 1:20. Как вариант – нитрофоска из расчёта 2 столовые ложки на 10 литров воды. Неплохо подходит и аммофоска, поскольку, кроме основных элементов питания (азот, фосфор и калий) она содержит кальций, магний и серу. Избегать стоит только хлорсодержащих удобрений, так как клубника хлор не переносит.

Следующая подкормка будет в августе, чтобы повысить зимостойкость культуры и помочь ей заложить почки на следующий сезон. В это время лучше вносить удобрения с повышенным содержанием калия и фосфора. Азот уже не нужен. Можно использовать на этом этапе монокалийфосфат из расчёта 10 грамм на 10 литров воды и по 0,5 литра на куст.

Если нет дождей, следите за почвой. Она должна быть влажной. Если не хватает влаги, листья становятся вялыми, желтеют и подсыхают по краям.

