

СТОП COVID-19**О ВАКЦИНАЦИИ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ****РОСПОТРЕБНАДЗОР**ЕДИНЬИЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43**1. Какая вакцина против COVID-19 лучше всего подходит для меня?**

Все вакцины, зарегистрированные в России, эффективны и безопасны.

2. Нужно ли мне прививаться, если я уже болел коронавирусом?

Да, вам следует сделать прививку, даже если у вас ранее был COVID-19.

3. Вакцины от COVID-19 могут встраиваться в ДНК?

Нет, ни одна из вакцин против COVID-19 никак не влияет на вашу ДНК и не взаимодействует с ней.

4. Могут ли вакцины против COVID-19 негативно повлиять на способность иметь детей?

Нет никаких доказательств того, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса, может повлиять на фертильность у женщин или мужчин.

**5. Вирус мутирует. Будут ли вакцины работать против новых вариантов?**

Пока значимых изменений патогенов, способных влиять на течение болезни или эпидемический процесс, не выявлено. Важно сделать прививку и продолжить меры по сокращению распространения вируса.

6. Может ли вакцина против COVID-19 вызвать положительный результат теста на заболевание, например, ПЦР-теста или антигенного теста?

Нет, вакцина против COVID-19 не может дать положительный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген.

7. Могу ли я заболеть после прививки?

После прививки от коронавируса (не из-за нее, а при последующем заражении вирусом) можно заболеть, описаны такие случаи. При появлении симптомов, в том числе ОРВИ, у привитого человека нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест.

Подробнее на www.rospotrebnadzor.ru**СТОП COVID-19****КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРИВИВКЕ****РОСПОТРЕБНАДЗОР**ЕДИНЬИЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43**1. Поможет ли антигистаминное лекарство (от аллергии) до или после прививки уменьшить реакцию на вакцину, избежать повышения температуры, боли и отека в месте укола?**

Нет, такая медикаментозная «подготовка» не нужна.

**2. Что делать, если после прививки возникает гриппоподобный синдром – повышается температура, болит голова и др.?**

Не у всех может быть такая реакция, но если она есть – это нормально. Допускается симптоматическая терапия.

**3. Что делать, если человек все-таки не уберется и после первой прививки подхватил коронавирус?**

В этом случае вторая доза вакцины не вводится.

**4. Что делать людям с хроническими заболеваниями (хронический гастрит, другие заболевания ЖКТ, артериальная гипертония и др.)?**

Людям с любыми хроническими заболеваниями нужно прививаться в первую очередь, поскольку они находятся в группе повышенного риска тяжелых осложнений COVID-19.

**5. Нужно ли перед вакцинацией сдать какие-нибудь анализы, пройти обследования?**

Таких требований нет. Главное, чтобы у вас в день вакцинации было нормальное самочувствие.

**6. Можно ли принять успокоительные препараты перед вакцинацией, чтобы не волноваться?**

Да, можно.

**7. Если человек аллергик, есть ли риск получить реакцию на вакцину?**

Если вы аллергик, обязательно сообщите об этом врачу перед прививкой. Врач порекомендует, какой вакциной привиться, у них разный состав.

Подробнее на www.rospotrebnadzor.ru